



Bệnh nhân hỏi ? Dược sĩ trả lời





**Nhờ dược sĩ
tư vấn cho
tôi cách
dùng thuốc
phòng ngừa
loét dạ dày -
tá tràng
do thuốc ?**

Tổ Dược lâm sàng
Tháng 5 - 2022



Không nên tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ



NHÓM THUỐC	CƠ CHẾ TÁC DỤNG	THUỐC CỤ THỂ	THỜI ĐIỂM DÙNG THUỐC	LƯU Ý
THUỐC KHÁNG ACID	TRUNG HÒA ACID DẠ DÀY	<ul style="list-style-type: none"> NHÔM HYDROXYD MAGNESI HYDROXYD 	 <p>UỐNG LÚC NO (TỐT NHẤT 1 GIỜ SAU ĂN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> VIÊN NÉN PHẢI NHAU KỸ TRƯỚC KHI NUỐT KHOẢNG CÁCH 1 GIỜ VỚI CÁC THUỐC KHÁC
THUỐC ỨC CHẾ BÀI TIẾT ACID DẠ DÀY	ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở TẾ BÀO THÀNH CỦA DẠ DÀY	<ul style="list-style-type: none"> OMEPRAZOL PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL RABEPRAZOL ESOMEPRAZOL 	 <p>UỐNG LÚC ĐÓI (TỐT NHẤT 1 GIỜ TRƯỚC ĂN)</p>	PHẢI NUỐT VIÊN THUỐC NGUYÊN VẸN KHÔNG ĐƯỢC MỠ, NHAU HOẶC NGHIỀN.
THUỐC GIẢM BÀI TIẾT ACID DẠ DÀY	CẠNH TRANH VỚI HISTAMIN Ở THỤ THỂ H2 CỦA CÁC TẾ BÀO THÀNH DẠ DÀY	<ul style="list-style-type: none"> CIMETIDIN RANITIDIN FAMOTIDIN NIZATIDIN 		BUỔI TỐI LÚC ĐINGỦ NẾU LIỀU 1 LẦN/NGÀY; HOẶC SÁNG VÀ TỐI NẾU LIỀU 2 LẦN/NGÀY
THUỐC BẢO VỆ NIÊM MẠC DẠ DÀY	BAO PHỦ VÙNG NIÊM MẠC BỊ TỔN THƯƠNG	SUCRALFAT	 <p>UỐNG LÚC ĐÓI (TỐT NHẤT 1 GIỜ TRƯỚC ĂN)</p>	KHOẢNG CÁCH 2 GIỜ VỚI CÁC THUỐC KHÁC



Hạn chế



Stress



Thức ăn chua cay



Thuốc lá

Thức uống có cồn