




**GỠY CỘT SỐNG LƯNG - THẮT LƯNG**

**Triệu chứng**



Đau lưng ngay vị trí gãy; tăng khi cử động, ngồi hoặc đi; giảm đau khi nằm.

Nếu gãy gây chèn ép thần kinh có thể bị tê bì, yếu liệt chi, rối loạn tiêu tiểu.

**Chẩn đoán**



X quang, CT scan.  
MRI.

**Điều trị**



**KHÔNG PHẪU THUẬT:**

- Nằm tuyệt đối tại giường 4-6 tuần tùy loại gãy
- Xoay trở tránh những biến chứng của nằm lâu như: loét tì đè, thuyên tắc mạch, viêm phổi...

**PHẪU THUẬT:**

- Chỉ định khi gãy gây chèn ép thần kinh hoặc ổ gãy mất vững.
- Phương pháp: phẫu thuật giải ép, ghép xương vào thân đốt sống gãy, cố định cột sống qua phẫu thuật lõi trước hoặc lõi sau.

**Biến chứng**



Bệnh nhân nằm lâu, không được xoay trở sẽ mắc các biến chứng như: loét tì đè, thuyên tắc mạch, viêm phổi.

Biến chứng nhiễm trùng vết mổ, tê yếu, liệt chi nặng hơn sau mổ.  
Tử vong.