



BỆNH VIỆN CHẨN THƯƠNG CHÍNH HÌNH
KHOA CỘT SỐNG B

PHIẾU TÓM TẮT
THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

VỆO CỘT SỐNG VÔ CĂN Ở THANH THIẾU NIÊN

Triệu chứng



Thay đổi đường cong sinh lý của cột sống; lệch vai, hông; Khó thở ở lưng.

Đau lưng. Đau tê chân khi có chèn ép thần kinh, ảnh hưởng chức năng hô hấp: nhóm triệu chứng này ít gặp hơn, thường xuất hiện ở vẹo tiến triển nặng.

Ở giai đoạn sớm, vẹo có thể tình cờ được phát hiện khi khám sức khỏe tổng quát.

Chẩn đoán



X quang và EOS, CT scan, MRI.

Hướng điều trị



KHÔNG PHẪU THUẬT:

- Mang nẹp, tập vật lý trị liệu và theo dõi sự tiến triển của vẹo. Phương pháp này thường được chỉ định khi vẹo nhẹ <40°, cột sống còn cân bằng, xương chưa trưởng thành.

PHẪU THUẬT:

- o Chỉ định:
 - Mức độ vẹo nặng > 40°
 - Mất cân bằng cột sống.
 - Vẹo có nguy cơ cao tiến triển nặng, có triệu chứng
 - Vẹo gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

PHƯƠNG PHÁP: bắt vít chân cung, nắn chỉnh vẹo

Biến chứng



Bệnh nhân nằm lâu, không được xoay trở sẽ mắc các biến chứng như: loét tì đè, thuyên tắc mạch, viêm phổi

Biến chứng nhiễm trùng vết mổ, tê yếu, liệt chi nặng hơn sau mổ, tử vong...

