



BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH
KHOA VI PHẪU TẠO HÌNH

**PHIẾU TÓM TẮT
THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ**

VẠT DA CHÉO NGÓN

**Chẩn đoán và chỉ định
phẫu thuật**



Vạt da chéo ngón được sử dụng điều trị mất da ở ngón tay lộ xương, gân hay dập đứt lìa một phần đốt xa ngón tay.

Điều trị



- Bệnh nhân được vô cảm bằng phương pháp tê đám rối thần kinh cánh tay hoặc tê gốc ngón.
- Vạt được bóc tách ở mặt lưng ngón tay kế cận bao gồm da mô dưới da, tương tự như mở bản lề cửa
- Sau khi phẫu thuật vạt da được khâu che lên vùng mất da ngón tay kế cận mất da lộ xương hoặc đứt lìa 1 phần đốt xa
- Vị trí lấy vạt da được ghép da dày và băng ép. Da ghép lấy từ da mặt trong 1/3 trên cẳng tay cùng tay hoặc da dày vùng bẹn

Chăm sóc sau mổ



Thay băng vết thương mỗi ngày, theo dõi màu sắc sự sống vạt da Da ghép vùng cho vạt được mở vào ngày thứ 5 sau mổ. Bệnh nhân sau đó theo dõi tại nhà hay Y tế địa phương. Sau mổ 3 tuần bệnh nhân được mổ tách 2 ngón tay ra và trải vạt da che phủ.

Biến chứng và điều trị



Hoại tử vạt da do tình trạng tắc mao mạch nuôi vạt xuất phát từ cuống vạt da.

Hư da ghép.

Nhiễm trùng vết mổ khi có tình trạng nhiễm trùng bệnh nhân sẽ được điều trị bằng các biện pháp kháng sinh, chăm sóc vết thương hoặc xem xét phẫu thuật cắt lọc vết thương.